

HÁBITOS DE FOTOEXPOSICIÓN SALUDABLES

FOTOSENSIBILIDAD POR FÁRMACOS



Fotosensibilidad
Ver prospecto

fototoxicidad	fotoalergia
Clínica	
- Monomorfa: eritema área fotoexpuesta - Edema, vesículas o ampollas - Hiperpigmentación residual - Inicio inmediato (30'-horas desde primera exposición)	- Polimorfa: erupción eczematosa, urticariforme, pruriginosa - Puede sobrepasar zona fotoexpuesta - Hay sensibilización previa - Aparición retardada 1-14 días post exposición
Fisiopatología	
Daño celular directo	Reacción inmunológica de hipersensibilidad retardada tipo IV
Dosis RUV	
Dosis dependiente UVA 320-400 nm	Pequeña
Agentes causales	
Plantas: fitodermatitis Perfumes: dermatitis de Berloque Fármacos (sistémicos>tópicos): dermatitis o fotofobia.	Perfumes, filtros solares, antisépticos, fármacos (tópicos>sistémicos).

- Evitar la exposición solar entre las 12 y 17h, sobre todo de mayo a septiembre (GR B).
- Evitar el eritema solar (quemadura solar), sobre todo en menores de 15 años (GR A).
- Utilizar ropa adecuada: manga larga, color oscuro, seca, tejido grueso y no escotada.
- Llevar sombreros de ala ancha.
- Utilizar gafas de sol que bloquen los rayos UVA y UVB.
- Utilizar filtros solares frente UVB y UVA con un FPS mínimo de 30.
- Fomentar las sombras ya que reducen el impacto directo de los UV.

REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD POR FÁRMACOS

NORMAS DE APLICACIÓN DE LOS FILTROS SOLARES

1. Uso diario.
2. Aplicar 20-30 minutos antes de la exposición solar.
3. Aplicar sobre la piel limpia y seca.
4. Cubrir toda la superficie cutánea de manera uniforme.
5. No olvidar zonas como las orejas, la nuca, párpados, pies, espalda ...
6. Repetir la aplicación cada 2 horas.
7. Repetir la aplicación después del baño, sudoración o haberse secado con la toalla.
8. Cantidad idónea: 2mg / cm² o 30 ml por todo el cuerpo (6 cucharadas de café por todo el cuerpo de un adulto de talla media).
9. Buscar un producto cosméticamente aceptable.
10. FPS mínimo de 30.



CAMFiC
socetat catalana de medicina
familiar i comunitària

Anna Escalé Besa
Alba Martínez Satorres



Grup de Dermatología de la CAMFiC
dermato@camfic.org

FÁRMACOS FOTOSENSIBILIZANTES SISTÉMICOS	
AINEs	TODOS (Piroxicam , naproxeno, sulindac, ...)
Anestèssics	Benzocaína, Procaína.
Antiácidos	Omeprazol, ranitidina
antiacné	Isotretinoína , Ac Retinoico, Retinol , peróxido de benzoilo. Adaptaleno
antiarrítmicos	Amiodarona , Quinidina Disoramida, flecainida, sotalol
Antibiótico	- Aminoglucósidos: Gentamicina - Lincosamides: Lincomicina - Macrólidos: Azitromicina - Quinolonas : Ácido Nalidíxico, Ácido Oxolínico, Ácido Pipemídico, Ciprofloxacino, Norfloxacina, Ofloxacina, Levofloxacino, Moxifloxacino. - Cefalosporinas: Ceftazidima. - Sulfonamidas : Sulfadoxina, Sulfametoxazol, Sulfasalazina, Sulfatiazol. - Tetraciclinas : Demeclociclina, Clortetraciclina, Oxiciclina, Tetraciclina, Doxiciclina, Minociclina. Eritromicina Trimetoprim - Antimicobacterianos (Antileprosos, Antituberculosos): Capreomicina, Clofazimina, Dapsone, Isoniazida, Pirazinamida.
Antidepresivos	- Tricíclicos : Imipramina Amitriptilina Doxepina, Nortriptilina, Amoxapina, Clomipramina, Protriptilina, Trimipramina - Isrs: Fluoxetina, Paroxetina, Sertralina, Trazodona - Imao: Tranxicipromina - Maprotilina, Venlafaxina, Mirtazapina
Antidiabéticos orales	Sulfonilureas : Clorpropamida, Tolbutamida, Glimepirida, Glipizida, Gliburida , Glibenclamida, Gliclazida, Gliquidona, Glisentida
Antiepilépticos	ácido valproico, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valpronamida. Lamotrigina, Felbamato, Topiramato, Gabapentina.
Antifúngico	Griseofulvina, Ketoconazol, Voriconazol.
AntiHTA	Acebutolol Antagonistas del calcio: amlodipina, Felodipino, Nifedipino, Diltiazem. IECA : Captopril, Enalapril, Fosinopril, Ramipril, Trandolapril. ARA II: Losartán

	Hidralazina, Metildopa, Minoxidil
Antihistamínicos	Alimemazina, Astemizol, Azatadina, Carbinoxamina, cetirizina, ciproheptadina, clemastina, clorfeniramina, Desclorfeniramina, difenhidramina, Dimenhidrinato, doxilamina, Ebastina, loratadina, Meclozina, Mizolastina, Prometazina, Terfenadina
Antineoplásicos	dacarbazine , Procarbazina, tegafur, Imatinib Metotrexato, flutamida, mitomicina, flucitosina Vinblastina, Bleomicina, Pentostatina, Bexaroteno, fluorouracilo, verteporfina, Interferón alfa y beta, Epirubicina
Antiparasitarios	Quinina, Cloroquina, Mebendazol, Pirimetamina, Quinina, Tiabendazol
Antipsicóticos	fenotiazina : Clorpromazina, Prometazina, Tioridazina, perfenazina butirofenonas: Haloperidol Atípicos: Clozapina, Clotiapina, Loxapina, Olanzapina, Pimozida, Quetiapina, Risperidona
Antipsoriásicos	psoraleno (Metoxaleno) Etretinato, Brea de hulla, Tazaroteno
Antiviricos	Amantadina, Ganciclovir, Ribavirina, Ritonavir, Saquinavir, valaciclovir, Interferón alfa y beta
Diuréticos	Acetazolamida Tiazidas: Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, Xipamida ... Diuréticos de asa: Furosemida, torasemida, Piretanida. Ahorradores de potasio: amilorida, triamtereno
Hipolipemiantes	Estatinas: Simvastatina, lovastatina, Pravastatina, Atorvastatina Fibratos: clofibrato, fenofibrato, gemfibrozilo
Hormonas sexuales	Estrógenos: Estradiol, Etnilestradiol Progestágenos: Algestona, desogestrel, Gestodeno, Levonorgestrel, etonogestrel, noretindrona. Anticonceptivos orales
Psicofármacos	BZDP: Alprazolam, Cloazepato dipotásico, Diazepam, Tetrazepam. Barbitúricos: Amobarbital, Pentobarbital, secobarbital.
Otros	Acenocumarol Azatioprina, Danazol, Penicilamina Sales de Hierro, Sales de Oro: Aurotiomalato Selegilina, Tacrolimus, Vitaminas: piridoxina

* en negrita los fármacos más fotosensibilizantes

FOTOSENSIBILIZANTES TÓPICOS	
FÁRMACOS	
Anestésicos	Benzocaína, Procaína
antiacné	Isotretinoína, Adapalè, tretinoína, peróxido de benzoilo
Antibióticos	Sulfamidas , Eritromicina
Antifúngicos	Clioquinol
Antihistamínicos	difenhidramina, Prometazina
Antipsoriásicos	psoraleno (Metoxalè), Brea de hulla
Antisépticos	Clorhexidina, mercurocromo (Merbromona)
Corticoides	Desoximetasona, Hidrocortisona
Otros fármacos	Bálsamo de Perú, Beta caroteno, Centella asiática, fluorouracilo, Minoxidil, piritiona de zinc, Riboflavina , Salicilamidas halogenadas, Sulfuro de cadmio
ACEITES ESENCIALES	
Aceites de bergamota, cedro, lavanda, lima, limón y sándalo	
COLORANTES	
Acriflavina, Amarillo de acridina, Antiquinona, Antraceno, Azul de metileno, Azul de toluidina, Azul de tripán, Eosina, Eritrosina Flúoresceína , Laca roja, Naranja de acridina, Rosa de bengala, Rojo neutro, Rojo naranja, Triapaflavina, Tionina	
CREMAS SOLARES	
cinamatos, Para aminobenzoico (PABA) y sus ésteres, Parafenildiamina, 6-acetoxi 2,4-dimetil-m-dioxano Isoamil- p, n, n-dimetilamino benzoato, oxibenzona y otros benzofenonas .	
OTROS	
Perfumes, derivados del alquitrán, agentes blanqueadores	

