


La syphilis

La syphilis est une infection sexuellement transmissible qui peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas traitée.

Elle est due à une bactérie appelée *treponema pallidum*. L'infection peut évoluer en quatre stades :

1. **Syphilis primaire.** Une plaie (chancro) apparaît à l'endroit où le contact a eu lieu. Il disparaît spontanément en quelques semaines. Il n'est pas douloureux et peut donc passer inaperçu.
2. **Syphilis secondaire.** Des tâches sont présentes sur la peau et peuvent être accompagnées d'autres symptômes, comme de la fièvre, des ganglions, une perte partielle des cheveux, des douleurs musculaires ou de la fatigue. Ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes après quelques semaines.



Dans certains cas, les symptômes de la syphilis primaire et secondaire peuvent être bénins et peuvent parfois passer totalement inaperçus.

3. **Syphilis latente.** Les bactéries restent dans l'organisme pendant des années sans produire de symptômes.
4. **Syphilis tertiaire.** La plupart des cas de syphilis n'évoluent pas jusqu'à le stade tertiaire. À ce stade, qui survient après quelques années, la maladie entraîne des dommages aux organes tels le cœur, le cerveau ou les reins.

La syphilis est transmise lors de rapports sexuels avec des patients infectés pendant les stades où les patients présentent des symptômes.

Comment détecte-t-on la syphilis ?

La syphilis peut être diagnostiquée avec un test sanguin ou avec un échantillon de la plaie.

Si on a déjà attrapé la syphilis, peut-on l'attraper de nouveau ?

Oui, si vous avez des rapports sexuels non protégés avec des personnes infectées par la syphilis primaire, secondaire ou latente, il est possible de contracter l'infection à nouveau.

Existe-t-il un traitement ?

Oui, le traitement repose sur l'administration d'antibiotiques injectables. La dose dépend du stade de la maladie.

Pour évaluer l'efficacité du traitement, des tests sanguins de contrôle sont nécessaires.



Y a-t-il des effets indésirables ?

Le traitement est généralement très bien toléré. Cependant, il peut y avoir une gêne ou une douleur ainsi que rougeur ou gonflement au point d'injection. Cela se résout spontanément. Parfois, il peut y avoir des symptômes de rhume, un mal de tête, des douleurs musculaires ou une fièvre, qu'on soulage avec du repos et des antalgiques.