

Vaccinul triplu viral

Este un vaccin cu virusuri vii atenuate. Se administrează subcutanat pentru prevenirea a trei boli cauzate de viruși: rujeolă, rubeolă și oreion.

Rujeola este o boală infecțioasă foarte contagioasă. Poate fi foarte gravă la copiii foarte mici și la adulți. Pot apărea complicații, cum ar fi otita, pneumonia sau encefalita.

Rubeola de obicei este ușoară și poate trece neobservată. În schimb, atunci când o femeie însărcinată suferă de aceasta, rubeola este periculoasă pentru făt, pentru că ar putea suferi de sindromul rubeolei congenitale, care i-ar putea afecta dezvoltarea organelor și ar putea provoca o naștere prematură sau un avort.

Parotita (sau oreionul) provoacă o umflare a uneia sau a mai multora dintre glandele salivare, de obicei a glandelor parotide. De cele mai multe ori este benign, dar uneori pot apărea complicații (mai ales la adulți). Cea mai frecventă la bărbații adolescenți este orhita (o inflamație a testiculului), iar la femei este ooforita (o inflamație a ovarului).

În Catalonia se administrează în mod sistematic o doză la vârsta de 12 ani și o a doua doză la școală, la vârsta de 3 ani. Adulții care nu au fost vaccinați când au fost mici, mai ales femeile aflate la vârstă fertilă, trebuie să primească două doze cu un interval de minim 4 săptămâni între ele.

Eficacitatea acestui vaccin este de 95% și poate fi administrat împreună cu alte vaccinuri, deși în zone diferite ale corpului.

Efectele adverse ale vaccinului

În cele mai multe cazuri, vaccinul nu provoacă niciun fel de reacție. Uneori, la între 5 și 12 zile de la administrarea sa, pot apărea simptome cum ar fi durerea și înroșirea locului în care s-a efectuat înțepătura, febră sau o iritație care dispăre la puține zile de la apariția sa.

Nu se poate administra în timpul sarcinii și trebuie să se evită să se rămână însărcinată într-o perioadă de o lună de zile de la administrarea sa pentru că i-ar putea provoca complicații grave fătului. Este important să se accepte această condiție.

În cazul în care suferiți o boală gravă, dacă luați un medicament care reduce sistemul imunitar sau dacă se prevede să vi se efectueze o transfuzie de sânge, consultați în prealabil cu specialiștii sanitari.

Consimțământ informat

Am fost informată cu privire la riscurile pe care le implică vaccinul rubeolic. Declar că în momentul de față nu sunt însărcinată și îmi iau angajamentul de a lua măsurile anticoncepționale necesare pe o perioadă de o lună de zile de la administrarea vaccinului triplu viral. De asemenea, îmi asum toată răspunderea în caz de sarcină.

Numele pacientului:

.....

DNI:

Numele profesionistului care efectuează vaccinarea:

.....

Centrul de vaccinare:

Data de vaccinare:

DA autorizez să mi se administreze vaccinul triplu viral.

NU autorizez să mi se administreze vaccinul triplu viral.

Semnătura
profesionistului

Semnătura
pacientului