


Vasectomie

Il s'agit d'une méthode de contraception permanente.

Elle est pratiquée chez les hommes qui ne souhaitent plus avoir d'enfants.



Comment se déroule l'opération ?

L'opération est réalisée en ambulatoire, sans hospitalisation, sous anesthésie locale. Une petite incision est pratiquée dans chaque scrotum pour bloquer définitivement le passage des spermatozoïdes vers le sperme. Ainsi, l'éjaculat du patient conserve un aspect normal, mais sans pouvoir déclencher de grossesse. Cette méthode est efficace à 99 %.

Quels sont les soins postopératoires ?

Le repos au lit ou l'administration d'héparine n'est pas nécessaire. Il est seulement recommandé de porter des sous-vêtements serrés pour réduire l'éventuelle gêne génitale et d'éviter les efforts physiques intenses et le sport dans les jours qui suivent l'intervention.

Quels sont les risques ?

Bien qu'il s'agisse d'une procédure sûre, toute intervention médicale comporte certains risques. Les plus courants sont une gêne temporaire dans la région, généralement légère, dans les jours qui suivent l'intervention. Plus rarement, des infections ou des défauts de fermeture de la plaie chirurgicale peuvent

survenir. Si un hématome important apparaît, vous devez consulter votre médecin.

Dans des cas exceptionnels, une inversion spontanée de l'interruption du canal déférent a été rapportée. Avant l'intervention, le chirurgien doit vous informer de tous les risques associés.

Quand prend-elle effet ?

La stérilité n'est pas immédiate après une vasectomie. Bien que la libération des spermatozoïdes soit interrompue, il peut en rester dans le liquide séminal et dans les canaux de sortie. C'est pourquoi, avant de pouvoir avoir des relations sexuelles sans risque de grossesse, des tests sont effectués pour confirmer le succès de l'intervention.

Les relations sexuelles après l'intervention

La vasectomie ne diminue pas la libido et n'empêche pas l'érection. Dans les premiers jours suivant l'opération, les rapports sexuels peuvent être inconfortables en raison de l'intervention elle-même et de l'accumulation de spermatozoïdes à l'intérieur des testicules. Après cette période, le corps compense le changement anatomique et les relations sexuelles redeviennent normales.

Maladies sexuellement transmissibles

La vasectomie est une méthode de prévention de la grossesse. Elle ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH ou la gonorrhée. Des mesures de protection supplémentaires, telles que les préservatifs, sont toujours nécessaires.

Et si je change d'avis ?

Dans des cas exceptionnels, une seconde opération peut être tentée pour inverser la procédure, mais dans 99 % des cas, elle est irréversible. Il n'y a aucune garantie de réussite de l'inversion de la procédure.

Cette option n'est pas couverte par le système de santé publique.