

Vaccin triple viral

Il s'agit d'un vaccin à virus vivants atténués. Il est administré par voie sous-cutanée pour prévenir trois maladies causées par des virus : la rougeole, la rubéole et les oreillons.

La **rougeole** est une maladie infectieuse très contagieuse. Elle peut être très grave chez les très jeunes enfants et les adultes. Des complications peuvent survenir, telles que l'otite, la pneumonie ou l'encéphalite.

La **rubéole** est généralement bénigne et peut passer inaperçue. En revanche, lorsqu'elle touche une femme enceinte, elle est dangereuse pour le fœtus, car elle peut provoquer le syndrome de rubéole congénitale, affecter le développement de ses organes et entraîner un accouchement prématuré ou une fausse couche.

Les **oreillons** (ou **parotidite**) provoquent un gonflement d'une ou plusieurs glandes salivaires, généralement les parotides. Ils sont généralement bénignes, mais des complications peuvent parfois survenir (en particulier chez les adultes). La plus fréquente chez les adolescents est l'orchite (inflammation des testicules) et chez les femmes, l'oophorite (inflammation des ovaires connue aussi comme ovarite).

En Catalogne, une dose est systématiquement administrée à l'âge de 12 mois, puis une deuxième dose à l'école, à l'âge de 3 ans. Les adultes qui n'ont pas été vaccinés dans leur enfance, en particulier les femmes en âge de procréer, doivent recevoir deux doses à au moins 4 semaines d'intervalle.

L'efficacité de ce vaccin est de 95 % et il peut être administré en même temps que d'autres vaccins, mais à des endroits différents du corps.

Effets indésirables du vaccin

Dans la plupart des cas, le vaccin ne provoque aucune réaction. Parfois, entre 5 et 12 jours après son administration, des symptômes peuvent apparaître, tels que

douleur et rougeur au point d'injection, fièvre ou éruption cutanée qui disparaît après quelques jours.

Il ne peut pas être administré pendant la grossesse et il faut éviter toute grossesse pendant le mois suivant son administration, car il peut entraîner de graves complications pour le fœtus. Il est important d'accepter cette condition.

En cas de maladie grave, si vous prenez un médicament qui réduit vos défenses immunitaires ou si une transfusion sanguine est prévue, consultez au préalable des professionnels de santé.

Consentement éclairé

J'ai été informée des risques liés au vaccin contre la rubéole. Je déclare ne pas être enceinte actuellement et m'engage à prendre les mesures contraceptives nécessaires pendant une période d'un mois après l'administration du vaccin triple viral. De même, j'assume l'entière responsabilité en cas de grossesse.

Nom de la patiente :

.....

Numéro d'identité :

Nom du professionnel qui effectue la vaccination :

.....

Centre de vaccination :

Date de vaccination :

☐ **OUI**, j'autorise l'administration du vaccin triple viral.

☐ **NON**, je n'autorise pas l'administration du vaccin triple viral.

Signature
du professionnel

Signature
de la patiente