


Implant subcutanat

Ce este și la ce se folosește?

Este o tijă flexibilă de plastic, lungă de 2 cm. Este așezată sub pielea feței interioare a brațului femeii și eliberează lent un singur tip de hormon (progestogeni). Efectul său durează între 3 și 5 ani, în funcție de cum se prezintă.



Previne sarcina prin stagnarea ciclului menstrual. De obicei, elimină menstruația sau reduce mult sângerarea, de aceea este folosită și pentru reglarea ciclurilor foarte grele sau pentru a preveni sângerarea provocată de unii polipi uterini numiți *fibroizi*.

Pentru ce nu este de folos?

Nu împiedică răspândirea bolilor cu transmitere sexuală și nici nu este o metodă de avort sau de încetare a sarcinii. De asemenea, nu este util pentru prevenirea sarcinii dacă este plasat după un contact sexual neprotejat.

Poate fi folosit de către oricine?

Nu este recomandat femeilor care au boli care agravează circulația sângelui (lupus, hipertensiune arterială, diabet ...) sau boli hepatice.

Ce efecte secundare provoacă?

Scade densitatea osoasă și crește astfel riscul de osteoporoză. De asemenea, împiedică fertilitatea în lunile următoare retragerii sale.

Deși de obicei retrage menstruația, în primele 3 luni ciclurile pot să apară și să fie neregulate. Poate provoca retenție de lichide, creștere în greutate, dureri de cap, schimbări ale stării de spirit sau iritabilitate și disconfort gastric. Deși rare, poate favoriza sângele să devină mai gros și astfel să faciliteze apariția cheagurilor în vene (tromboză), la fel ca în toate metodele contraceptive hormonale. Acest lucru este mai frecvent la pacienții fumători sau care, din cauza călătoriilor lungi, a bandajelor, ghipsurilor etc., și-au menținut picioarele imobilizate.

Când începe să se utilizeze?

Amplasarea trebuie făcută între prima și a cincea zi de menstruație.

Este recomandabil să testați utilizarea pastilelor înainte de a utiliza această metodă de lungă durată.

Când trebuie înlocuit?

Dacă este plasat un implant cu o singură tijă (care conține 68 mg progestogen), acesta trebuie înlocuit la 3 ani. Dacă implantul este plasat cu două tije (75 mg fiecare), acesta trebuie înlocuit la 5 ani, cu excepția femeilor cu o greutate mai mare de 80 kg, caz în care va fi înlocuit în al patrulea an, pentru pierderea eficacității ulterioare.

Ce se întâmplă dacă uit să-l scot?

Își pierde eficacitatea ca metodă contraceptivă și crește riscul de sarcină. Trebuie utilizat prezervativul timp de 7 zile.

Cât timp poate fi utilizată această metodă?

Poate fi utilizat până la menopauză, când menstruația dispăre.