
Exploració Abdominal



Exploració sistemàtica dels òrgans i vasos

Aorta i Cava

Pàncreas

Fetge

Vesícula

Porta

Ronyo dret

Ronyo esquerre

Melsa

Bufeta orina

Pròstata / Uter



LES 10 IMATGES (1/2)


- 1. Lòbul hepàtic esquerre (i VCI) – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 2. Epigastri
 - a. Longitudinal: aorta i artèria mesentèrica superior
 - b. Transversal: tronc celíac o vena esplènica i pàncrees (la que es vegi millor)
- 3. Vena porta, artèria hepàtica i via biliar (“*Mickey Mouse*”) – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 4. Vesícula biliar – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 5. Lòbul hepàtic dret

LES 10 IMATGES (2/2)

- 6. Ronyó dret (inclou lòbul hepàtic dret per comparar ecogenicitat) – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 7. Longitudinal de melsa a nivell de l'hili esplènic
- 8. Ronyó esquerre – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 9. Bufeta – *Doble pantalla* (longitudinal i transversal)
- 10. Home: Pròstata - *Doble pantalla* (longitudinal i transversal). Dona: úter i annexes (longitudinal i transversal).


1. Lòbul hepàtic esquerre

tall longitudinal




1. Lòbul hepàtic esquerre


tall transversal




2. Epigastri (longitudinal)





2. Epigastri (longitudinal)




2. Epigastri (transversal)




3. Hili portal




3. Hili portal




Zoom




4. Vesícula biliar




4. Venes suprahepàtiques




5- Lòbul hepàtic dret



6. Ronyó dret




7. Melsa




8. Ronyó esquerre





9. Bufeta




10. Pròstata



10. Úter



10. Úter



ECO - FAST



Què és?

- **Focused**
 - **Assessment with**
 - **Sonography for**
 - **Trauma**
-
- Ecografia centrada en la valoració del trauma abdominal



En què consisteix?

- Buscar sang en traumatisme toraco-abdominal tancat
- Buscar aire/sang en espai pleural
- Buscar líquid lliure
- Detectar dany en òrgans sòlids




Amb què i quan es fa?

- Ecògraf
- Sonda convex
- Integrada a l'atenció del pacient





Com es fa?

- 1. Vista subxifoidea
- 2. Quadrant superior D
- 3. Quadrant superior E
- 4. Vista de la pelvis



1. Vista subxifoidea

pericardi, LHE



2- Quadrant superior D- HCD

Fossa Morrison, LHD, ronyó D




3. Quadrant superior E - HCE




4. Vista de la pelvis

Fons de sac Douglas



Let's go!





ecoAP

