

Instruccions per a la vacunació del grup 4: persones amb grans dependències, incloent-hi els seus cuidadors

La etapa 1 de vacunació contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), en el grup 4, inclou la vacunació de les persones amb gran dependències (grau III reconegut). Addicionalment, tenint en compte les característiques i vulnerabilitat davant la infecció per SARS-CoV-2, també es vacunaran les persones amb grau reconegut de dependència II i I que acudeixen a centres de dia, i, en la mesura del possible, persones en programes d'ATDOM sobre tot aquelles més grans de 80 anys.

La vacunació d'aquest col·lectiu, així com dels seus cuidadors més directes (formals i informals que no pertanyen als serveis d'ajuda al domicili (SAD)) es durà a terme pels equips d'atenció primària de cada territori.

Els cuidadors directes que es vacunaran en aquesta fase són:

- Personal de centres de dia
- Altres cuidadors remunerats
- Cuidadors informals de persones amb gran dependència que no es puguin desplaçar a vacunar als centres indicats (centres de dia, punts de vacunació o centres de salut) que cuiden d'aquestes fent tasques que impliquin un contacte directe (activitats d'higiene, àpats, etc.). En el cas de cuidadors informals (sovint familiars) es vacunarà un màxim d'una persona per persona dependent i de preferència que sigui una persona d'edat avançada.

Els professionals sanitaris dels equips d'atenció primària disposaran de la següent informació de les persones que tenen assignades:

- Llistats per a identificar a les persones, d'acord amb la base de dades proporcionada pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies amb data 31 desembre 2020, on s'inclou el grau de dependència (I, II o III), així com si assisteixen a un centre de dia, i si estan inclosos en el programa ATDOM.

- Informació de les persones que ja han rebut una dosi de vacuna (les persones institucionalitzades estan excloses d'aquest llistat -que serien les ja vacunades, ara mateix- tanmateix pot haver algun cas amb algun registre no actualitzat).
- Aquests llistats són accessibles en els centres amb ECAP a nivell de UBA, perfil RUP i SAP.
- Els equips d'atenció primària que no disposen de l'aplicació ECAP rebran els llistats directament.
- S'enviarà la informació actualitzada a mesura que avanci la vacunació.

Organització de la vacunació

Per a la vacunació, s'utilitzaran vacunes d'ARNm (Comirnaty de Pfizer/BioNtech) per a les persones amb gran dependència. Per això, s'han establert diferents centres d'atenció primària distribuïts per tot el territori que seran punts d'emmagatzematge d'aquestes i altres vacunes contra la Covid-19. Aquests centres, seran els punts de recepció i emmagatzematge de les vacunes centralitzats i són més de 80 a tot Catalunya.

Els cuidadors de fins a 55 anys sense patologia greu es poden vacunar amb vacuna d'Oxford-AstraZeneca.

Consideracions a tenir en compte:

- Hi ha més de 80 punts d'emmagatzematge de vacunes COVID-19 distribuïts territorialment gestionats des dels SEGIVS i radicats en un CAP o similar. Aquests punts, al seu torn, seran de referència per cadascun de la resta d' EAP . Cada EAP recollirà les vacunes per anar a vacunar del seu punt de referència.
- Els equips d'atenció primària que seran punts d'emmagatzematge s'han de coordinar amb els seus referents dels diferents Serveis de Gestió de vacunes (SEGIVS) de cadascun dels territoris.
- Hi haurà un lliurament setmanal de dosi en un dia determinat que es comunicarà. Les comandes s'han de fer com a molt tard el dijous de la setmana anterior (per a poder generar les comandes els divendres per part dels referents dels SEGIVS).

- Els referents dels SEGIVS, seran els encarregats de coordinar totes les necessitats i de coordinar-se amb els referents de vacunes dels diferents punts de recepció de vacunes.

Els punts d'emmagatzematge ubicats als centres de salut hauran de garantir l'**emmagatzematge correcte de les vacunes contra la COVID-19, i que se'n faci una gestió i administració que compleixin la normativa i recomanacions vigents segons el document de *Requisits per a la vacunació contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) als centres sanitaris***. En aquest document, s'inclouen les recomanacions per al trasllat de les vacunes.

Caldrà tenir en compte en tot moment les recomanacions de vacunació i característiques de les vacunes. Per a més informació:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/>

D'altra banda, la base de les actuacions ha de ser la *Guia per a la gestió de vacunes als centres sanitaris* disponible a:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Suport-logistic-a-la-distribucio-de-vacunes/guia-per-a-la-gestio-de-vacunes-als-centres-sanitaris-/

Operativa per a la vacunació

Per a dur a terme la vacunació, caldrà:

- Contactar amb les persones a vacunar i identificar quines d'elles es poden traslladar als punts de vacunació i quines s'han de vacunar a domicili. Registrar si alguna persona no vol ser vacunada. No vacunar a persones en situació terminal de vida. Retardar la vacunació de les persones amb malaltia descompensada.
- Per a les persones que es puguin desplaçar, caldrà establir els punts de vacunació (centres de dia, CAPs o altres espais habilitats) i organitzar amb els responsables dels centres la operativa (dia de vacunació i persones a vacunar, incloent-hi els treballadors dels centres de dia (cuidadors formals)). Sempre s'han de programar persones a vacunar en múltiples de 6, i no s'obrirà un vial si no s'asseguren 6 persones identificades per vacunar.

- Per a les persones que no es puguin traslladar caldrà identificar també els cuidadors informals principals i coordinar-ne la vacunació.
- Cal vacunar també aquelles persones amb aquestes característiques que el professional identifiqui encara que no estiguin al llistat, per exemple els que estiguin pendents de la resolució del grau de dependència o casos resolts després del 31 de desembre.
- És molt important informar correctament a l'ECAP el motiu de vacunació de cada persona. Cal registrar també les persones que rebutgen la vacunació.

Tenint en compte les característiques de les vacunes contra la Covid-19 caldrà tenir en compte que:

- Vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNtech: els vials són de sis dosis i una vegada diluïts no es poden traslladar amb vehicles a motor. Sí es poden traslladar amb molta cura caminant i evitant qualsevol vibració. Cal tenir en compte les recomanacions de manipulació i ús.

Es recomana el trasllat dels vials una vegada diluïts a temperatura entre 2°C i 8 °C amb neveres portàtils que garanteixin la conservació de les vacunes i seguint les recomanacions establertes (veure Recomanacions per al transport de vacunes des del centre sanitari fins al punt de vacunació). Els vials caldrà que estiguin correctament immobilitzats per evitar qualsevol vibració o moviment.

- Per a la vacunació a domicili:

Identificar les persones a vacunar (incloent-hi els seus cuidadors segons definició anterior) i també persones de 80 anys o més anys pròximes als domicilis per a garantir la utilització de totes les dosis dels vials durant les 6 hores posteriors a la seva obertura o dilució (vacuna Comirnaty).

Planificar un circuit a partir de la identificació d' almenys 6 persones que se puguin vacunar en una distància que es pugui recórrer a peu. Si no hi ha persones amb gran dependència per completar les 6 dosi, completar amb persones de 80 anys o més, i, si encara i així no és possible, completar les 6 dosis incloent persones en programes d'ATDOM. En aquest circuit es poden incloure els nous ingressos en residències.

Obrir el vial en el primer domicili i extreure la dosi a aplicar. Vacunar, registrar i esperar almenys els 15 minuts d'observació.

Una vegada passats aquests minuts anar al següent domicili i així fins a completar el circuit previst. Cada una de les dosis s'extraurà just abans de la seva administració.

Anar sempre un mínim de dos professionals (Infermeres i/o metges amb TCAI) i portar tot el material necessari, tant per la vacunació com per la resolució de qualsevol possible reacció adversa immediata.

Recomanacions per al transport de vacunes des del centre sanitari fins al punt de vacunació (si és necessari)

Aquestes recomanacions són vàlides només per a les vacunes contra la COVID-19 dels laboratoris Pfizer/Bionotech i Oxford-AstraZeneca.

Les vacunes del Laboratori Moderna no s'han de transportar.

- El material que s'utilitzi ha d'estar net i en condicions adequades i cal respectar les condicions de manipulació i emmagatzematge de cada una de les vacunes.
- Cal immobilitzar les vacunes a l'interior dels recipients o les caixes per evitar que els vials es puguin moure durant el transport.
- Cal seguir les recomanacions del fabricant per a cada dispositiu utilitzat per al transport de vacunes. Els acumuladors de fred han d'estar a una temperatura d'entre 2 °C i 8 °C (preferiblement dins de la nevera).
- S'han d'utilitzar els acumuladors necessaris segons la capacitat de la caixa o nevera portàtil isotèrmica i de la quantitat de vacunes a transportar. A mode orientatiu, els temps aproximats per al transport de les vacunes són els següents:

TIPUS DE MATERIAL	TEMPS MÀXIM DE TRANSPORT
NEVERA PORTÀTIL* (3 ACUMULADORS)	1 hora i 30 minuts
NEVERA PORTÀTIL* (4 ACUMULADORS)	2 hores

*Les proves s'han realitzat amb una nevera portàtil estàndard.

- No es poden sobrepassar els temps indicats a les caixes i/o neveres portàtils isotèrmiques i cal obrir el recipient només quan sigui necessari. El temps màxim de transport depèn de les característiques del recipient utilitzat.

- Cal evitar exposicions directes a fonts de calor, líquids o altres elements que puguin malmetre les vacunes.
- En cas de detectar qualsevol incidència, cal posar-se en contacte amb el Servei de Gestió Integral de Vacunes de referència (SeGIV).

Programa de Vacunacions de Catalunya

Barcelona, 16 de febrer de 2021