

posicionament CAMFiC



POSICIONAMENT DEL GRUP DE TREBALL HTA DE LA CAMFiC SOBRE EL COVID 19 I TRACTAMENT AMB IECA I ARAII

Darrerament han aparegut notícies que relacionen una major mortalitat en la infecció COVID-19 en pacients hospitalitzats amb antecedents d'HTA. Una de les possibles hipòtesis estudiades és la sobreexpressió de receptors de l'angiotensina II en les cèl·lules alveolars, que facilitarien la major infectivitat en els pacients hipertensos, especialment en els tractats amb inhibidors de l'enzim convertidor de l'angiotensina (IECA) o els antagonistes el receptor de l'angiotensina II (ARA II). De moment l'evidència científica d'aquesta relació no està encara demostrada; es fonamenta amb dades epidemiològiques sense estudis de causalitat.

Per un altre costat, hi ha alguns estudis en animals en els que s'observen efectes beneficiosos d'aquests fàrmacs en la prevenció de complicacions pulmonars, encara que tampoc s'ha pogut demostrar en humans.

I no només els IECA i ARA II augmenten l'expressió d'aquests receptors; altres fàrmacs diferents als antihipertensius també presenten aquest efecte.

Per aquest motiu, el GdT d'HTA de la CAMFiC, d'acord amb la resta de Societats i organismes oficials afirmem que no s'ha de retirar el tractament amb IECA o ARAII.

No hi ha evidència per aconsellar mesures especials de prevenció en els pacients hipertensos, diferents a les de la resta de la població.


Tampoc hi ha evidència suficient per canviar les directrius de tractament d'aquests pacients, seguint pautes diferents a les marcades en les guies actuals, com sempre s'hauria d'individualitzar davant cada cas.

Grup d'HTA de la CAMFiC

Barcelona 18 de març de 2020



www.camfic.cat

 informans@camfic.org