

并非所有的都是疣

疣是良性皮损。表现为因皮肤增厚导致的隆起的肿块，触感粗糙、轮廓边缘分明。疣是由某些类型的人乳头状瘤病毒引起的。

皮肤上的一些其他小肿块或隆起的损伤可能会被误认为是疣，但其实它们属于其他种类的良性皮损，无需治疗。



有哪些损伤可能会被误认为是疣？

- 通过蒂状根部与皮肤相连的小而柔软的肿块。好发于易摩擦的部位、颈部、腋窝、腹股沟、眼睑或乳房下。这些小的良性增生在其直径小于5mm时叫做**皮赘**（acrocordones），直径超过5mm时叫做**软纤维瘤**（fibromas blandos）。它们很常见，尤其好发于穿紧身衣或佩戴链条的超重人群。其数量随年龄的增长而增多。存在家族倾向。**发病部位应避免摩擦。**
- 直径1mm至6mm的肿块，颜色鲜红，好发于躯干。被称为**老年性血管瘤**。属于良性血管增生，非常常见，且其数量和大小均随年龄的增长而增多、增大。存在遗传倾向。

- 大小不一、坚硬的深色肿块（但在肤色较浅的人群中，可能呈粉红色）。这种皮损是皮肤内部的小疤痕。被称为**皮肤纤维瘤**。尤其好发于成年人，特别是腿部。
- 干燥皮肤堆积的深色肿块。叫做**脂溢性角化病**。这是最常见的皮损，尤其好发于老年人。有遗传因素。偶见于不到30岁的人群。

所有这些损伤均为**良性**，不会引起不适。**无需任何治疗**。仅出于美容考虑进行治疗。即使去除了所有皮损，随着时间的推移，仍会出现。仅对造成不适的单发皮损进行治疗或去除。



法律明确规定，公共医疗不包含出于美容目的而进行的皮损治疗。